

PREPARAZIONE PER PETTC CON E SENZA MDC EV

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- Documento di riconoscimento valido;
- Portare esami eseguiti in precedenza (TAC, RM, PET) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare e la richiesta specialistica (del medico specialista e/o della struttura sanitaria richiedente)
- Preparare 2 impegnative dal Vostro Medico come segue:

1 RICETTA

92186.002 Tomoscintigrafia globale corporea (PET)

Il medico curante dovrà indicare obbligatoriamente una di queste note e/o diagnosi specifiche:

NOTA. 191 A: Valutazione malignità dopo TC e/o RM

NOTA. 191 B: Ricerca tumore primitivo occulto in pz con metastasi accertata e/o successivamente a indagine diagnostica TC e/o RM

NOTA. 191 C: Stadiazione di neoplasia

NOTA. 191 D: Diagnosi differenziale tra recidiva tumorale e radionecrosi

NOTA. 191 E: Valutazione di malignità e/o della risposta al trattamento chemio-terapico

NOTA. 191 F: Ristadiazione di neoplasia per sospetto clinico/laboratoristico/strumentale di recidiva di neoplasia

2 RICETTA

TC cranio senza e con m.d.c. (cod. 87031.002),

TC collo senza e con m.d.c. (cod.87038.002),

TC torace senza e con m.d.c. (cod. 87411.002),

TC addome superiore senza e con m.d.c. (cod. 88012.001),

TC pelvi senza e con m.d.c. (cod. 88014.002).

Al termine dell'esame è consigliato non avere contatti prolungati e ravvicinati con bambini e donne in gravidanza fino al termine della giornata.

ESAMI PRELIMINARI

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Azotemia, Glicemia, Creatinemia, Emocromo, QPE, GOT, GPT;

- E.C.G.

- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in alternativa ricerca catene Kappa e Lambda su siero.

- Rx torace;

In caso di pazienti nefropatici, che già eseguono terapia farmacologica, è opportuna una valutazione preliminare della CREATININEMIA da parte del medico curante.

Preparazione per la parte PET:

- * È necessario un digiuno di circa 6 ore con ultimo pasto povero di carboidrati: pane, pasta, dolci
- * Si può bere acqua nel periodo di digiuno (nessun'altra bevanda contenente zucchero).
- * Si può assumere la terapia abituale ai soliti orari.
- * In caso di paziente diabetico che fa uso di insulina o pillola, assumere la terapia antidiabetica insieme ad un piccolo pasto 6 ore prima dell'esecuzione dell'esame (è consigliabile comunicare di essere diabetici al momento della prenotazione, così da avere un appuntamento in tarda mattinata).

Preparazione per la parte TC:

giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l'esame:

- assumere al mattino una compressa di **BENTELAN 1 mg**;
- assumere a mezzogiorno una compressa di **RANITIDINA 150**;
- assumere alla sera una compressa di **ZIRTEC 4 mg**;

INFORMATIVA La durata totale dell'esame può variare dai 20 ai 60 minuti .

Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 0817606111 Le apparecchiature necessarie ed il personale addestrato per fronteggiare qualsiasi urgenza/emergenza saranno prontamente disponibili.

Ho letto e compreso quanto sopra ed ho ottenuto risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento.